

## **PRACOWNIA ENDOSKOPOWA**

nr 29 765 23 95 (wyłącznie w godzinach 11-14)

DATA I GODZINA BADANIA.....

### **PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII ZE ZNIECZULENIEM**

**Na 2 tygodnie przed badaniem należy zgłosić się do Gabinetu Konsultacji Anestezjologicznych ( I piętro, pok. 135) , po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Rejestracji Głównej Szpitala.**

**2 dni przed badaniem NIE SPOŻYWAĆ:** Tłustych wędlin (np. kielbasy) i mięs, sałatek, warzyw i owoców pestkowych, pestek (np. siemię lniane, mak, winogrona, pomidory, kiwi, truskawki itp.), ciemnego pieczywa, napojów gazowanych, przecierów owocowych

**ZALECANE:** Dieta płynna, kisiele, kleik, ryż, makaron, chleb bez ziaren, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane klarowne, herbata, kawa (bez fusów)

**1 dzień przed badaniem LEKKOSTRAWNE ŚNIADANIE:** herbata, bułeczka (bez mleka, surowych warzyw i owoców, napojów gazowanych)

**Godzina 14:00 – 15:00 –** precedzony bulion

**Po godzinie 15:00 –** woda niegazowana, herbata, można ssać landrynki, miód

**Około godziny 16:00** rozpuścić 3 saszetki **Fortransu (lek na receptę)** w 3 litrach niegazowanej wody (1 saszetka na 1 litr) i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut

**O godzinie \_\_\_\_\_ (w dniu badania)** – rozpuścić 1 saszetkę **Fortransu** w 1 litrze wody i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut

**Jeśli pacjent będzie miał wykonywane badanie kolonoskopii w znieczuleniu ostatnia dawka przygotowania musi być przyjęta najpóźniej 4-5 godzin przed znieczuleniem!**

### **WAŻNA INFORMACJA!**

Ze względu na występowanie polipów w jelicie i możliwość ich usunięcia w trakcie badania kolonoskopii wskazane jest **odstawienie leków wpływających na krzepliwość krwi** (takich jak: Acard, Polocard, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Warfaryna, Brilique i inne) o terminie odstawienia leku i ewentualnie zastępczym leczeniu heparyną drobnocząsteczkową **DECYDUJE LEKARZ.**

Nieodstawienie wyżej wymienionych leków może wiązać się z koniecznością powtórzenia badania z planową polipektomią.

- Na 7 dni należy odstawić preparaty żelaza.
- Nie przyjmować w dniu badania leków przeciw cukrzycy oraz insulin
- W dniu badania leki kardiologiczne w tym na nadciśnienie tętnicze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami, w dniu badania należy zażyć wcześniej rano popijając niewielką ilością wody.